DRA.
Maria Eduarda Mattos

Preparo · Manometria Esofágica de Alta Resolução

MOTILIDADE DO ESÔFAGO · FUNÇÃO DOS ESFÍNCTERES

A Manometria Esofágica de Alta Resolução avalia a motilidade do esôfago e a função dos esfíncteres, sendo essencial no diagnóstico de acalasia, disfagia e refluxo refratário. **O preparo correto garante um exame de maior qualidade.** O tempo total de permanência na clínica é de aproximadamente 2 horas.

DURAÇÃO	SEDAÇÃO	PEDIDO MÉDICO	LOCAL
10 a 20 minutos	Não há sedação	Obrigatório	CAD · Rio Verde, GO

Passos para o dia do exame

1. Jejum absoluto, inclusive de água, de 8 horas antes do horário marcado para o exame.
2. O exame pode ser feito em qualquer horário do dia: conte as horas de jejum a partir do horário agendado.
3. Para casos especiais (crianças, idosos, diabéticos), o tempo de jejum é avaliado individualmente.
4. Trazer o pedido médico e exames anteriores (endoscopia digestiva, raio-X do esôfago).
5. Chegar com 10 minutos de antecedência.
6. Pós-exame: você poderá retornar às suas atividades normais imediatamente, inclusive dirigir.

Medicamentos · orientações importantes

MEDICAMENTO	CONDUTA	OBSERVAÇÃO
Para dor torácica (se for o caso): Dilacoron, Isordil, Cardizem e Diltiazem	**Suspender 48 horas antes**	*Somente com orientação médica*
Medicamentos para motilidade (domperidona, metoclopramida, bromoprida ou similares)	**Suspender 48 horas antes**	*Somente com orientação médica*
Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, antiácidos, Sucrafilm ou Lufta Gastro Pro	**Pode manter**	*Não interfere neste exame*
Medicamentos para hipertensão, diabetes, problemas pulmonares e cardiológicos	**Pode manter**	*Não interfere neste exame*

O exame não causa dor. Uma sonda fina é introduzida pelo nariz; o desconforto é momentâneo e bem tolerado pela maioria dos pacientes.

Dra. Maria Eduarda Mattos · Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia
CAD · Clínica do Aparelho Digestivo · Rua Nizo Jaime de Gusmão · Rio Verde, GO · WhatsApp (64) 99337-7649 · @dra.mariaeduarda_mattos

Documento informativo. Em caso de dúvida, fale com a equipe antes do exame. Nunca suspenda medicamentos por conta própria.